

Basler Langstieler

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Basler Langstieler
Synonymes	Süsshäner Herzkirsche
Type de variété	Classique
Origine	Bien connue et répandue dans la région de Bâle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-tardif

Récolte Mi-juil. **Maturité** De suite

Grosueur Moyenne

Chair Tendre à mi-ferme. Très juteuse, assez sucrée, bien acidulée, moyennement épicée avec une légère amertume en début de maturité.

Maladies (fruits). Peu sensible au rougissement prématuré, à la gommose et aux maladies cryptogamiques (fruits). Moyennement sensible à la maladie criblée.

Remarques

Grande résistance au gel de printemps et à l'éclatement.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez Mme Yolande Duparc sur la commune de Val-de-Charney ; n°280 ; alt. 870 m

Aeppli A. et al., 1983 : 100 variétés de fruits
www.prospecierara.ch

Bigarreau d'Elton

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Bigarreau d'Elton
Synonymes	Bigarreau Elton's Bunte Cerise d'Angleterre
Type de variété	Ancienne
Origine	Obtenu par T.-A. Knight vers 1800 à Elton, Angleterre.

Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit précoce		
Récolte	Mi-juin	Maturité	De suite
Grosueur	Moyenne à grande		
Chair	Blanchâtre, ferme, un peu filamenteuse. Jus doux, suffisant et fort sucré.		
Maladies	Pas d'indication		

Remarques

Arbre très vigoureux qui se porte mieux en haute-tige.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Bernard Regez à Chamby sur la commune de Montreux ; n°261 ; alt. 900 m

Leroy A., 1873 : Dictionnaire de Pomologie

Bigarreau Napoléon

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Bigarreau Napoléon
Synonymes	Gros Bigarreau blanc
Type de variété	Ancienne
Origine	Incertaine ; fin des années 1700



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve

 Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-précoce

Récolte Fin juin à début juil. **Maturité** De suite

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Blanc jaunâtre, ferme, juteuse et sucrée

Maladies Maladies courantes des cerisiers, dont la maladie criblée

Remarques

Arbre assez vigoureux d'une bonne fertilité

Références

Arbre connu dans le Parc : chez Mme Floriane Tschudi à Chamby sur la commune de Montreux ; no 508 ; alt. 900 m

Leroy A., 1873: Dictionnaire de Pomologie

Vauthier B., 2008 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande

Cassadent

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Cassadent
Synonymes	Croquadent
Type de variété	Ancienne
Origine	Recensé par B. Vauthier (2011) dans la Broye fribourgeoise



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-précoce

Récolte Début juil. à mi-juil. **Maturité** De suite

Grosueur Gros fruit

Chair Peau grenat virant au noir à maturité. Chair ferme, un peu croquante, passablement sucrée et aromatique.

Maladies

Remarques

Fruits sensibles à la pluie.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Bernard Grangier à Montbovon sur la commune de Haut-Intyamont ; n°293 ; alt. 800 m

Vauthier B., 2011 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande.

Guinde noire

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Guinde noire
Synonymes	
Type de variété	Ancienne
Origine	Variété retrouvée à Cheyres (FR), attestée en 1937.



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-tardif

Récolte Mi-juil. **Maturité** De suite

Grosueur Moyenne à petite

Chair Ferme, croquante, rafraîchissante et sucrée.

Maladies Pas d'indication

Remarques

Se conserve en bocaux et donne une excellente confiture.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez Mme Jacqueline Enderlin à Chamby sur la commune de Montreux ; n°265 ; alt. 900 m

Vauthier B., 2011 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande
Rétropomme
www.bdn.ch

Heidegger

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Heidegger
Synonymes	Grosse von Heidegg
Type de variété	Classique
Origine	Variété issue d'un semis à partir d'une sélection de porte-greffe de la station fédérale de Wädenswil ; répandue depuis les années 1960



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-tardif

Récolte	Mi-juil.	Maturité	De suite
Grosueur	Gros fruits		
Chair	Ferme à croquante, moyennement juteuse, assez sucrée ; arôme harmonieux avec une pointe d'acidité.		
Maladies	Peu sensible à la gommose et au chancre bactérien		

Remarques

Végétation de l'arbre moyenne à forte
 Les fruits ont tendance à éclater avec l'humidité
 Cerise de type bigarreau
 Manque un peu de couleur pour la mise en conserve

Références

Arbre connu dans le Parc : chez Mme Anne Pitsaer à Cerniat sur la commune de Val-de-Charmey; n°285 ; alt. 920 m

Aeppli A., et al., 1983 : 100 variétés de fruits
 Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Kordia

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Kordia
Synonymes	Techlovicka Techlo II
Type de variété	Moderne
Origine	Semis de hasard trouvé en 1963 à proximité de Techlovice en Tchécoslovaquie



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-tardif

Récolte Fin juil. **Maturité** De suite

Grosueur Gros fruit

Chair Ferme, croquante, très juteuse, assez sucrée avec une acidité rafraîchissante ; arôme harmonieux

Maladies

Remarques

Fruits peu sensibles à l'éclatement

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Daniel Schori à Villard-sur-Chamby sur la commune de Montreux ; n°390 ; alt. 900 m

Aeppli A., et al., 1983 : 100 variétés de fruits

Noire de Chavannes

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Noire de Chavannes
Synonymes	Guigne noire de Chavannes
Type de variété	Classique
Origine	Inconnue ; surtout répandue dans le canton de Vaud



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-précoce

Récolte Mi-juil. **Maturité** De suite

Grosueur Moyenne

Chair Molle à mi-ferme, juteuse, modérément sucrée, agréablement acidulée

Maladies Sensible à la maladie criblée

Remarques

Convient plutôt pour les régions douces

Références


Arbre connu dans le Parc : chez M. Bernard Fragnière à Lessoc sur la commune de Haut-Intyamont ; n°96 ; alt. 800 m.

Aeppli A., et al., 1983 : 100 variétés de fruits

Noire de Montreux

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Noire de Montreux
Synonymes	
Type de variété	Classique
Origine	Ancienne variété avec différents types, sélectionnée en 1932 par la station fédérale d'essais viticoles de Lausanne



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit mi-précoce à mi-tardif		
Récolte	Mi-juil.	Maturité	De suite
Grosueur	Moyenne à petite		
Chair	Douce et sucrée à maturité ; jus abondant, très coloré		
Maladies	Moyennement sensible à la maladie criblée		

Remarques

Arbre vigoureux, adapté à l'altitude (jusqu'à 1'000 m) ; fruits supportant bien la pluie et peu sujets à l'éclatement

Références

Arbre connu dans le Parc : commune de Montreux ; no 00

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Rouge de Gollion

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Rouge de Gollion
Synonymes	
Type de variété	Classique
Origine	« Jusqu'à vers 1950, ces variétés constituent, dans le canton de Vaud et le pays de Gex, une bonne partie de l'assortiment. » (Vauthier B., 2011)



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit mi-précoce à mi-tardif		
Récolte	Début à mi-juil.	Maturité	De suite
Grosueur	Moyenne à petite		
Chair	Mi-ferme voire molle, translucide, à saveur relevée, douce, sucrée à jus incolore.		
Maladies	Pas d'indication		

Remarques

Résiste bien à la pluie et à l'éclatement.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Daniel Turrian à Flendruz sur la commune de Rougemont ; n°306 ; alt. 1010 m

Vauthier B., 2011 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande.
 Rétropomme
www.bdn.ch

Schauenburger

Description générale

Essence	Cerisier
Variété	Schauenburger
Synonymes	Flurianer
Type de variété	Classique
Origine	Importée du Liban vers 1900 par B. Flury puis diffusée depuis Bad Schauenburg près de Liestal



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit plutôt tardif

Récolte Fin juil. à début août **Maturité** De suite

Grosseur Grande

Chair Ferme, juteuse, modérément sucrée et acidulée. Arôme agréable moyennement épicé.

Maladies Peu sensible au rougissement prématuré, au chancre bactérien et à la maladie criblée, modérément sensible à la gommose.

Remarques

Variété résistante au gel sur fleur et peu sensible à la pourriture.
Arbre robuste et vigoureux

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Christophe Rémy à La Tine sur la commune de Rossinière ;
n°530 ; alt. 950 m

Aeppli A., et al., 1983 : 100 variétés de fruits

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne